

Adler Ferruplex Tabletten

Biochemisches Arzneimittel nach Dr. Schüssler



INFORMATION FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt bzw. von Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wann wird Adler Ferruplex angewendet?

Gemäss dem biochemischen Therapiekonzept nach Dr. Schüssler kann Adler Ferruplex angewendet werden bei Erkältungskrankheiten und zur Unterstützung der Abwehrkräfte bei Erkältungsanfälligkeit. Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapie.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Adler Ferruplex gleichzeitig eingenommen werden darf.

Bei hohem Fieber oder Verschlechterung des Zustandes ist die frühzeitige Konsultation des Arztes angezeigt.

Dieses Arzneimittel enthält 0,25 g verwertbare Kohlenhydrate pro Tablette. (Bei Einnahme von 1 bis maximal 80 Tabletten pro Tag entsprechend 0,25 g bis 20 g Lactose pro Tag).

Mit diesem Arzneimittel können keine grobstofflichen Mangelzustände (z.B. an Eisen, Zink) behandelt werden.

Wann darf Adler Ferruplex nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Bei Kindern unter 3 Jahren soll Adler Ferruplex nicht angewendet werden.

Bitte nehmen Sie Adler Ferruplex erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 0,25 g Lactose (0,125 g Glucose und 0,125 g Galactose) pro Tablette. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen. (Bei Einnahme von 1 bis maximal 80 Tabletten pro Tag entsprechend 0,25 g bis 20 g Lactose pro Tag).

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- ▶ an anderen Krankheiten leiden
- ▶ Allergien haben oder
- ▶ andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen.

Darf Adler Ferruplex während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Adler Ferruplex?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben:

Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren:

Bei akuten Beschwerden alle 5–10 Minuten 1 Tablette

In allen anderen Fällen alle 30 Minuten 1 Tablette

Nicht mehr als 80 Tabletten am Tag einnehmen. Bei Kindern unter 3 Jahren soll Adler Ferruplex nicht angewendet werden.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Adler Ferruplex im Mund zergehen lassen.

Bei Kindern kann die Tablette mit ein paar Tropfen Wasser zu einem Brei verrührt werden.

Adler Ferruplex können bis unmittelbar vor dem Essen und ab 15 Minuten nach dem Essen eingenommen werden.

Dauer der Anwendung

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Adler Ferruplex haben?

Häufigkeit nicht bekannt (kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden):

Bei der Einnahme des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden oder einer abführenden Wirkung kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln

können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Adler Ferruplex ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

In der Originalverpackung und bei Raumtemperatur (15–25°C) aufbewahren.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Adler Ferruplex enthalten?

1 Tablette à 260 mg enthält

Wirkstoffe

Nr.3 Ferrum phosphoricum (HAB) D12 (HAB 6) 70mg, Nr.4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 40mg, Nr.8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 40mg, Nr.9 Natrium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 50mg, Nr.21 Zincum chloratum (Zinci chloridum Ph.Eur.) D12 (HAB 6) 30 mg, Nr.26 Selenium (HAB) D12 (HAB 6) 30mg.

Hilfsstoffe

250 mg Lactose, Kartoffelstärke und Calciumbehenat.

Zulassungsnummer

65112 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Adler Ferruplex? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung. Packungen zu 400 und 1000 Tabletten.

ZULASSUNGSINHABERIN

Adler Pharma Helvetia AG

Dorfplatz 10, CH-6060 Sarnen, Schweiz

HERSTELLERIN

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH

Brucker Bundesstrasse 25A, A-5700 Zell am See, Österreich

Diese Packungsbeilage wurde im MONAT JAHR letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Adler Ferruplex Comprimés

Biochimie selon Dr Schüssler



INFORMATION DESTINÉE AUX PATIENTS

Lisez attentivement la notice d'emballage, car elle contient de précieuses informations.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit par votre médecin ou vous l'avez acheté dans une pharmacie ou une parapharmacie sans prescription médicale. Pour en tirer le meilleur bénéfice, utilisez ce médicament conformément à la notice ou selon les instructions de votre médecin, du pharmacien ou du parapharmacien, resp. de la pharmacienne ou de la parapharmacienne. Conservez cette notice d'emballage afin de pouvoir éventuellement la relire ultérieurement.

Quand utiliser Adler Ferruplex?

Conformément au concept thérapeutique biochimique selon le Dr. Schüssler, Adler Ferruplex peut être utilisé en cas de rhume ou pour soutenir les défenses immunitaires en cas de prédisposition aux refroidissements.

L'utilisation de ce médicament pour l'indication mentionnée se réfère uniquement aux principes d'une approche thérapeutique homéopathique.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez-lui, à votre pharmacien ou à votre droguiste si Adler Ferruplex peut être pris en même temps.

En cas de fièvre élevée ou de détérioration de l'état, il convient de consulter rapidement un médecin.

Ce médicament contient 0,25 g de glucides par comprimé. (En cas de prise de 1 à maximum 80 comprimés par jour, cela correspond à 0,25 g à 20 g de lactose par jour).

Ce médicament ne convient pas au traitement d'états de carence en substances grossières (par ex. fer, zinc).

Quand Adler Ferruplex ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Adler Ferruplex ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 3 ans.

Si votre médecin a diagnostiqué chez vous une intolérance au sucre, veuillez l'informer avant de prendre Adler Ferruplex.

Ce médicament contient 0,25 g de lactose (0,125 g glucose et 0,125 g de galactose) par comprimé. Il convient d'en tenir compte pour les patients présentant un diabète sucré. (En cas de prise de 1 à maximum 80 comprimés par jour, cela correspond à 0,25 g à 20 g de lactose par jour).

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- ▶ vous souffrez d'une autre maladie
- ▶ vous êtes allergique ou
- ▶ vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Adler Ferruplex peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois,

aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possibile à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Adler Ferruplex?
Sauf prescription contraire de votre médecin:

Enfants dès 3 ans et adultes:

En cas de troubles aigus, 1 comprimé toutes les 5-10 minutes
Dans les autres cas, 1 comprimé toutes les 30 minutes

Ne pas prendre plus de 80 comprimés par jour. Adler Ferruplex ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 3 ans.

En cas d'amélioration des troubles, réduire la fréquence des prises.

Laisser fondre Adler Ferruplex dans la bouche.

Chez l'enfant, le comprimé peut être mélangé à quelques gouttes d'eau chaude pour former une bouillie.

Adler Ferruplex peut être pris immédiatement avant le repas et à partir de 15 minutes après.

Durée d'utilizzazione

Si les troubles s'aggravent ou si aucune amélioration n'est constatée après 7 jours, consultez un médecin.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Adler Ferruplex peut-il provoquer?

Fréquence non connue (ne peut être estimée d'après les données disponibles):

Ce médicament peut déclencher chez les personnes souffrant d'intolérance au lactose des troubles gastro-intestinaux ou des diarrhées.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Cela s'applique plus particulièrement aux effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice.

La prise de médicaments homéopathiques peut entraîner une aggravation temporaire des troubles (aggravation initiale). En cas d'aggravation durable, stoppez la prise d'Adler Ferruplex et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant sur le récipient.

Consignes de stockage: Conserver le médicament dans son emballage d'origine à température ambiante (15-25 °C). Conserver hors de portée des enfants.

Autres instructions: Vous pourrez obtenir de plus amples informations auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Que contient Adler Ferruplex?

1 comprimé de 260 mg contient

Principes actifs: N°3 Ferrum phosphoricum (HAB) D12 (HAB 6) 70 mg, n°4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 40 mg, n°8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 40 mg, n°9 Natrium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 50 mg, n°21 Zincum chloratum (Zinci chloridum Ph.Eur.) D12 (HAB 6) 30 mg, n°26 Selenium (HAB) D12 (HAB 6) 30 mg.

Excipients: 250 mg de lactose, de féculé de pomme de terre et de béhénate de calcium.

Numéro d'autorizzazione

65112 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Adler Ferruplex? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Emballages de 400 et 1000 comprimés.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION: Adler Pharma Helvetia AG, Dorfplatz 10, CH-6060 Sarnen, Suisse

FABRICANT: Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH, Brucker Bundesstrasse 25A, A-5700 Zell am See, Autriche

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en MOIS ANNEE par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Adler Ferruplex Compresse

Biochimica secondo il Dr. Schüssler



INFORMAZIONE DESTINATA AI PAZIENTI

Legga attentamente il presente foglietto illustrativo perché contiene informazioni importanti.

Questo farmaco Le è stato prescritto personalmente dal Suo medico oppure lo ha acquistato senza prescrizione medica presso la Sua farmacia o drogheria. Utilizzi il farmaco secondo le istruzioni contenute nel foglietto illustrativo o secondo le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere così da ottenere il massimo risultato possibile. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo leggere anche in futuro.

Quando si usa Adler Ferruplex?

Secondo il concetto di terapia biochimica del Dr. Schüssler, Adler Ferruplex può essere utilizzato per il trattamento di malattie da raffreddamento e per rinforzare le difese immunitarie in caso di predisposizione a questo tipo di malattie. L'uso di questo medicamento negli ambiti indicati si basa esclusivamente sui principi della terapia omeopatica.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi Adler Ferruplex. In caso di febbre alta o di peggioramento delle condizioni, si consiglia di consultare tempestivamente un medico. Ogni compressa contiene 0,25 g di carboidrati utilizzabili. (L'assunzione da 1 a max. 80 compresse al giorno corrisponde a un'assunzione di lattosio giornaliera da 0,25 g a 20 g). Questo medicamento non può essere utilizzato per il trattamento di carenze di sostanze minerali (ad es. ferro, zinco).

Quando non deve essere assunto Adler Ferruplex o può essere assunto solo con cautela?

Non utilizzare Adler Ferruplex nei bambini di età inferiore ai 3 anni.

Se si deve avere una intolleranza allo zucchero, assumi Adler Ferruplex solo dopo aver consultato il medico.

1 compressa contiene 0,25 g di lattosio (0,125 g di glucosio e 0,125 g di galattosio). I pazienti con diabete mellito devono tenerne conto. (L'assunzione da 1 a max. 80 compresse al giorno corrisponde a un'assunzione di lattosio giornaliera da 0,25 g a 20 g).

Informi il suo medico o il suo farmacista se

- ▶ soffre di altre malattie
- ▶ soffre di allergie o
- ▶ assume altri medicinali (anche acquistati di propria iniziativa!).

Si può assumere Adler Ferruplex durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Adler Ferruplex?

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti e bambini sopra i 3 anni:

In caso di sintomi acuti 1 compressa ogni 5-10 minuti

In tutti gli altri casi 1 compressa ogni 30 minuti

Non assumere più di 80 compresse al giorno. Non utilizzare Adler Ferruplex nei bambini di età inferiore ai 3 anni.

Ridurre la frequenza di somministrazione in caso di miglioramento dei disturbi.

Lasciar sciogliere Adler Ferruplex in bocca.

Per i bambini, la compressa può essere sciolta con un paio di gocce d'acqua a formare una pappina.

Adler Ferruplex può essere assunto fino a subito prima dei pasti e a partire da 15 minuti dopo aver mangiato.

Durata dell'utilizzo

Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 7 giorni, consultare il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino, farlo visitare da un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Adler Ferruplex?

Fréquence non nota (non può essere stimata dai dati disponibili):

per le persone affette da intolleranza al lattosio, l'assunzione del farmaco può portare a problemi del tratto gastro-intestinale o avere un effetto lassativo.

Se nota degli effetti collaterali informi il suo medico o il suo farmacista. Ciò vale in particolare per gli effetti collaterali che non sono descritti in questo foglietto illustrativo.

Quando si assumono farmaci omeopatici, i sintomi possono temporaneamente peggiorare (peggioramento iniziale).

Se il peggioramento continua, interrompa l'assunzione di Adler Ferruplex e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento può essere assunto solo fino alla data indicata con «da consumare entro il» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25 °C).

Mantenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Per ulteriori informazioni si rivolga al suo medico o al suo farmacista.

Cosa contiene Adler Ferruplex?

1 compressa da 260 mg contiene:

Principi attivi: N. 3 Ferrum phosphoricum (HAB) D12 (HAB 6) 70 mg, n. 4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 40 mg, n. 8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 40 mg, n. 9 Natrium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 50 mg, n. 21 Zincum chloratum (Zinci chloridum Ph.Eur.) D12 (HAB 6) 30 mg, n. 26 Selenium (HAB) D12 (HAB 6) 30 mg.

Excipients: 250 mg lattosio, fecola di patate e beenato di calcio.

Numero dell'omologazione

65112 (Swissmedic)

Dove si acquista Adler Ferruplex? Quali confezioni sono disponibili?

Presso farmacie e drogherie senza prescrizione medica. Confezioni da 400 e 1000 compresse.

TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE: Adler Pharma Helvetia AG, Dorfplatz 10, CH-6060 Sarnen, Svizzera

FABBRICANTE: Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH, Brucker Bundesstrasse 25A, A-5700 Zell am See, Austria

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel MESE ANNO dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).